

## THP-1-EGFP 细胞使用说明书

### 产品基本信息

产品货号	YC-D011-EGFP-P		
细胞名称	THP-1-EGFP	细胞形态	单核细胞, 悬浮生长
荧光抗性	EGFP, Puro	传代比例	传代时控制细胞密度在 2x10 <sup>5</sup> ~4.0x10 <sup>5</sup> 个细胞/ml, 并在细胞生长至 8x10 <sup>5</sup> ~1.0x10 <sup>6</sup> 个细胞/ml 时 进行传代
培养体系	90%RPMI-1640+10%FBS (源井改良)		
冻存液体系	90%FBS+10%DMSO	半药浓度	Puro=1.0 μg/ml
特殊备注	该细胞培养需要严格控制细胞培养密度。该细胞复苏活率较低, 建议使用澳胎 FBS 复苏或者提高 FBS 比例为 20%复苏, 待细胞正常传 2 代后, 可换回正常培养体系培养。		

### 产品验证数据

#### (1) 质粒图谱



电话: 400-688-9033


网址: www.ubigene.com

地址: 广州市黄埔区瑞吉二街45号京广协同2号楼A栋12楼


美国办事处: 855 777 3210

欧洲办事处: 800 3272 9252


亚太联系方式: 001 800 3272 9252



## (2) 细胞图片



(THP-1-EGFP-100X)



(THP-1-EGFP-100X)

## EGFP 稳转细胞株介绍

源井生物所提供的 EGFP 稳转细胞株采用慢病毒法构建，能够稳定高效地表达 EGFP 荧光蛋白，可作为慢病毒感染实验中的对照细胞株使用。



## 细胞接收

- 1) 冻存细胞：如果是干冰运输的冻存细胞，收到后请立即转入液氮储存或短暂（24H）放至-80°C冰箱保存，或直接进行细胞复苏。
- 2) 活细胞：如果是 T25 瓶活细胞运输，收到后用 75%的酒精对 T25 瓶外表面进行消毒，之后放在 5%CO<sub>2</sub>、37°C的细胞培养箱静置 2h，静置后取出细胞瓶在显微镜下观察细胞贴壁情况和细胞汇合度，分别在 100X 和 40X 下各拍 2 个不同视野的细胞拍照记录。首次处理时将培养基转移至 2 个 50mL 离心管，1100rpm，离心 4min，弃上清，用 2mL 完全培养基重悬细胞，取 20μL 细胞进行细胞计数并检测细胞活率，根据细胞计数将细胞密度调整为  $2 \times 10^5 \sim 4.0 \times 10^5$  个细胞/mL；视细胞密度将细胞重悬在不同规格的培养瓶中。具体参考表 1。（灌满细胞培养基不能正常用来培养细胞。）

注意：收到细胞后，活细胞首先观察细胞瓶是否完好，培养液是否漏液、浑浊等现象。冻存细胞若发现干冰已挥发完、冻存管瓶盖脱落、破损等异常情况，请务必**拍照保留**，并于收货 24h 内与我们联系（电话：400-688-9033；<https://www.ubigene.com>）。

## 细胞复苏

- 1) 准备工作：将完全培养液置 37°C水浴锅预热 30 分钟，随后将冻存的细胞从液氮中取出，转移到-80°C冰箱，放置数分钟让残余液氮挥发；
- 2) 在超净台内用吸管吸取 6-7 mL 完全培养液至 15 mL 离心管中；
- 3) 将细胞从-80°C冰箱取出暂时放置于干冰里，复苏时稍稍甩动，去除残留的干冰和液氮，再迅速用镊子夹住盖子放入 37°C水浴中快速晃动（注意：水不能没过盖子），使其在 1 分钟左右完全融化；
- 4) 在超净台内，用酒精棉球擦拭冻存管外壁消毒，稍稍晾干。用单道移液器将所有融化的细胞悬液转至提前准备好的完全培养液中，盖上盖子，1100 rpm 室温离心 4 分钟收集细胞；
- 5) 超净台内小心吸弃上清，用单道移液器吸取 1 mL 新鲜完全培养液重悬细胞至单细胞悬液，再转



移至装有 4 mL 完全培养液的 T25 cm<sup>2</sup> 培养瓶 (或者 6cm 的皿) 中, 写上细胞名称、复苏日期、代次, 放置 37°C、5% CO<sub>2</sub> 饱和湿度培养箱内培养。

注意: 请勿直接复苏到 T75 cm<sup>2</sup> 瓶或 10cm 的皿。

## 细胞传代

待细胞长至规定的密度即可传代, 悬浮细胞的传代可分为以下两种情况:

A. 半换液: 细胞状态良好, 细胞碎片较少, 培养基没有变黄情况下使用半换液传代;

- 1) 在超净台内把培养瓶内细胞吹打均匀, 取 20μL 细胞进行细胞计数;
- 2) 根据计数结果, 吸弃部分细胞悬液, 将细胞密度调整为  $2 \times 10^5 \sim 4.0 \times 10^5$  个细胞/mL 内培养, 视细胞培养密度将细胞培养在不同规格的培养瓶中。

B. 全换液: 当细胞状态良好, 细胞碎片较多, 培养基变黄的情况下, 使用全换液;

- 1) 在超净台内将培养液转至 15mL 离心管或 50mL 离心管中, 1100rpm 离心 4 分钟;
- 2) 弃上清, 用单道移液器吸取 1mL 完全培养基重悬细胞沉淀, 20μL 细胞悬液进行细胞计数;
- 3) 根据细胞计数结果, 将细胞密度调整为  $2 \times 10^5 \sim 4.0 \times 10^5$  个细胞/mL 内培养, 视细胞培养体积将细胞培养在不同规格的培养瓶中。置于 5%CO<sub>2</sub>、37°C 的细胞培养箱培养即可。

表 1 悬浮细胞不同体积培养基对应不同培养瓶列表

培养物规格	培养基体积
6 孔板	3 mL
T25	5mL-8mL
T75	12mL-28mL
T175	30mL-50mL



注意：为了维持 EGFP 基因表达量的稳定，活率大于 70%时建议半药培养。

## 细胞冻存

- 1) 按细胞传代的方法，在超净台内把培养瓶里的细胞转移到 50mL 离心管，1100 rpm 室温离心 4 分钟；
- 2) 离心后，打开盖子倒去上清，用 1~2 mL 4°C 预冷的冻存液重悬细胞，用移液管吹打混合均匀，取 20  $\mu$ L 进行细胞计数，随后加入冻存液调整至密度为  $5 \times 10^6$ - $1 \times 10^7$  个细胞/mL。
- 3) 将细胞悬液按 1 mL/管平均分装至冻存管中，旋紧盖子，冻存管应提前贴好细胞名称、来源、细胞代次、数量、冻存日期；
- 4) 将冻存管放置于 4°C 预冷的程序降温盒中，并在冻存结束的 15 分钟之内将程序降温盒放置超低温冰箱内；
- 5) 过夜后，将冻存细胞转移至液氮罐内保存。

