

转染专用培养基 M 使用说明书

■ 产品信息

| | | | |
|------|---|----|-------|
| 货号 | YM-WM-100 | | |
| 名称 | 转染专用培养基 M | | |
| 组分 1 | 基础培养基 | 规格 | 440ml |
| 组分 2 | 胎牛血清 (FBS) | 规格 | 50ml |
| 组分 3 | 谷氨酰胺 (L-Glutamine) | 规格 | 5ml |
| 组分 4 | 青霉素/链霉素 (P/S) | 规格 | 5ml |
| 适用细胞 | MDCK(NBL-2))、SK-N-SH、U-87 MG 等。 | | |
| 质量控制 | 通过细菌、真菌、支原体、内毒素检测。 通过渗透压、pH 检测。 通过产品性能检测。 | | |

■ 保存条件

- 1) 套装内所有成分均需避光保存。
- 2) 套装内基础培养基需置于 4°C 冰箱保存，保质期为 1 年；血清需置于-20°C 保存，保质期为 1 年；其他成分需置于-20°C 保存，保质期为 1 年。
- 3) 配制后的完全培养基，需放置 4°C 保存，保质期为 1 个月；若能保证培养条件稳定，容器密封性能良好，避免冷热交替，则保质期可适当延长，但不得超过 45 天。
- 4) 谷氨酰胺非冷冻状态下会自发分解，且分解速度与环境温度正相关。若完全培养基存放时间较长，建议适量补加 L-谷氨酰胺。



电话:400-688-9033

网址:www.ubigene.com

地址:广州市黄埔区瑞吉二街45号京广协同2号楼A栋12楼

美国办事处:855 777 3210

欧洲办事处:800 3272 9252

亚太联系方式:001 800 3272 9252

- 5) 所有产品请于保质期内使用，过期的成分可能严重影响培养效果。

■ 使用方法

- 1) 配制前至少 6h，将套装中的胎牛血清放置于 4°C冰箱内完全融化。配制前至少 30min，将套装中双抗和 L-谷氨酰胺放置于室温内，直至完全融化。
- 2) 用 75%医用酒精仔细擦拭所有成分外包装，在超净台内打开包装。将血清、双抗、L-谷氨酰胺全部加入基础培养基中。
- 3) 取少量基础培养基，洗涤各瓶、管，尽可能将所有成分全部加入基础培养基中。拧紧基础培养基瓶盖，轻柔并充分摇匀。用封口膜密封瓶口，并标注名称、配制日期等信息。

注：源井生物通用型转染培养基 M 适用于转染前后调整细胞生长状态，显著提高细胞活力与转染效率，从而有效提高阳性率。

■ 注意事项

- 1) 融化后的血清中可能出现絮状物，其主要成分为析出的血纤蛋白，这不会影响产品使用效果。若不是对细胞培养体系的纯净度要求极高，我们不建议过滤或离心去除絮状物。
- 2) 融化后的 L-谷氨酰胺可能出现白色颗粒状析出物，或呈乳白色浊液，这是正常现象。可以短暂 37°C水浴后反复吹打，重新溶解。
- 3) 若短期内无法用完全部培养基，我们建议分批配制。请按照套装内各成分比例，配制所需量。但剩余的成分必须严格按照各自的保存条件妥善保存，并且不可多次冻融。
- 4) 完全培养基套装内的所有成分都严格控制无菌，一般情况下我们不建议再次除菌。若配制过程有污染风险，可将完全培养基过滤除菌。



电话:400-688-9033



网址:www.ubigene.com



地址:广州市黄埔区瑞吉二街45号京广协同2号楼A栋12楼

美国办事处:855 777 3210

欧洲办事处:800 3272 9252

亚太联系方式:001 800 3272 9252