

转染专用培养基 (MDA-MB-468) 使用说明书

产品信息

货号	YM-WD-020		
名称	转染专用培养基 (MDA-MB-468)		
组分 1	MDA-MB-468 专用基础培养基	规格	440ml
组分 2	胎牛血清 (FBS)	规格	50ml
组分 3	谷氨酰胺 (L-Glutamine)	规格	5ml
组分 4	青霉素/链霉素 (P/S)	规格	5ml
质量控制	通过细菌、真菌、支原体、内毒素检测。 通过渗透压、pH 检测。 通过产品性能检测。		

保存条件

- 1) 套装内所有成分均需避光保存。
- 2) 套装内基础培养基需置于 4°C 冰箱保存, 保质期为 1 年; 血清需置于 -20°C 保存, 保质期为 1 年; 其他成分需置于 -20°C 保存, 保质期为 1 年。
- 3) 配制后的完全培养基, 需放置 4°C 保存, 保质期为 1 个月; 若能保证培养条件稳定, 容器密封性能良好, 避免冷热交替, 则保质期可适当延长, 但不得超过 45 天。
- 4) 谷氨酰胺非冷冻状态下会自发分解, 且分解速度与环境温度正相关。若完全培养基存放时间较长, 建议适量补加 L-谷氨酰胺。
- 5) 所有产品请于保质期内使用, 过期的成分可能严重影响培养效果。



电话: 400-688-9033

网址: www.ubigene.com

地址: 广州市黄埔区开源大道198号中巨华夏科技园四楼

美国办事处: 855 777 3210

欧洲办事处: 800 3272 9252

亚太联系方式: 001 800 3272 9252

■ 使用方法

- 1) 配制前至少 6h，将套装中的胎牛血清放置于 4°C 冰箱内完全融化。配制前至少 30min，将套装中双抗和 L-谷氨酰胺放置于室温内，直至完全融化。
- 2) 用 75% 医用酒精仔细擦拭所有成分外包装，在超净台内打开包装。将血清、双抗、L-谷氨酰胺全部加入基础培养基中。
- 3) 取少量基础培养基，洗涤各瓶、管，尽可能将所有成分全部加入基础培养基中。拧紧基础培养基瓶盖，轻柔并充分摇匀。用封口膜密封瓶口，并标注名称、配制日期等信息。

注：源井生物转染专用培养基适用于转染前后调整细胞生长状态，显著提高细胞活力与转染效率，从而有效提高阳性率。

■ 注意事项

- 1) 融化后的血清中可能出现絮状物，其主要成分为析出的血纤蛋白，这不会影响产品使用效果。若不是对细胞培养体系的纯净度要求极高，我们不建议过滤或离心去除絮状物。
- 2) 融化后的 L-谷氨酰胺可能出现白色颗粒状析出物，或呈乳白色浊液，这是正常现象。可以短暂 37°C 水浴后反复吹打，重新溶解。
- 3) 若短期内无法用完全培养基，我们建议分批配制。请按照套装内各成分比例，配制所需量。但剩余的成分必须严格按照各自的保存条件妥善保存，并且不可多次冻融。
- 4) 完全培养基套装内的所有成分都严格控制无菌，一般情况下我们不建议再次除菌。若配制过程有污染风险，可将完全培养基过滤除菌。

