


## gga-OVAL 慢病毒产品说明书

### 产品基本信息

|    |                           |      |              |
|----|---------------------------|------|--------------|
| 货号 | YV-OE-LV001-gga-OVAL-1000 | 名称   | gga-OVAL 慢病毒 |
| 规格 | 病毒量 1.00E+08TU            | 荧光抗性 | EGFP; Puro   |
| 滴度 | ≥1.00E+08TU/mL            | 储存条件 | -80°C        |

### 载体图谱



### 产品简介

卵清蛋白是鸡蛋清中的主要成分，通常用作研究激素对组织中基因表达调控的标志物。该病毒携带鸡卵清蛋白基因 (gga-OVAL),可用于构建 gga-OVAL 基因过表达的稳转细胞株。

### 产品接收

1) 源井生物的 gga-OVAL 慢病毒产品使用干冰运输，收到货物后请把病毒置于-80°C保存，同时避



免反复冻融。

- 2) 病毒可在-80°C稳定保存至少 6 个月，若储存时间超过 6 个月，建议在使用前重新测定病毒滴度。
- 3) 促感染试剂 Polybrene 随病毒发货，保存在-20°C。

## ■ 使用方法

**MOI 值：**复感染指数，定义为感染时病毒和细胞数量的比值，对于不同种类不同来源的细胞，其最适 MOI 各有差别。一般选择能达到 80%感染效率，并且细胞状态不受影响的 MOI 作为最佳 MOI。对于易感细胞，其 MOI 在 1~10。对于较难感染的细胞，可能需要 20 或更高的 MOI。

**Polybrene：**一种促感染试剂，其常用浓度为 5~8  $\mu\text{g}/\text{mL}$ 。Polybrene 能通过中和电荷间的相互作用来增强病毒与细胞膜的结合，从而提高病毒的转导效率。但 Polybrene 对于某些细胞有毒性，不同细胞对 polybrene 的敏感度不同，必要的话可以设置几个工作浓度以测试 Polybrene 对靶细胞的毒性。源井生物提供的 Polybrene 的浓度为 0.5 mg/mL，如有需要，使用过程中可用 PBS 或培养液进行稀释。

### 对于贴壁细胞：

- 1) 病毒转导前一天，准备好 1 个 12 孔板，将细胞消化成单细胞悬液，计数；取  $2 \times 10^6$  的细胞量，平均分配至 12 孔板，摇晃均匀，置于 37°培养箱培养过夜。使得进行病毒转导当天的细胞汇合率处于 30~50%。
- 2) 取 2~3 个孔的细胞消化成单细胞悬液并进行细胞计数，计算平均每个孔的细胞量 N。
- 3) 将病毒从冰箱取出置于冰上融化，用移液器轻柔吹打混匀。
- 4) 吸去原有培养基，加入 1/2 体积的新鲜培养基，并加入 polybrene 至终浓度为 5~8  $\mu\text{g}/\text{mL}$ 。根据病毒的滴度 T (TU/mL) 和细胞量 N 计算所需的病毒体积，直接吸取病毒液加入细胞中，摇晃均匀后放培养箱内继续培养。病毒用量的计算公式为： $V (\mu\text{L}) = 1000 \times \text{MOI} \times N / T$ 。例：如果 MOI=10，病毒滴度为  $4 \times 10^8 \text{ TU}/\text{mL}$ ，细胞量为 200000，则加入的病毒体积为 5  $\mu\text{L}$ 。
- 5) gga-OVAL 慢病毒共同转导 24 小时后，吸出含有病毒和 Polybrene 的培养液，更换新鲜的




完全培养液。

**注意：病毒感染时间太长可能会影响细胞状态，这种情况可以将病毒感染时间缩短至 6~8 小时。**

- 6) gga-OVAL 慢病毒携带绿色荧光基因，在病毒感染 48~72 小时后可通过显微镜观察细胞产生病变的面积以判断表达效果。对一些代谢旺盛的细胞（如 293T），病毒感染 24 小时后即可观察到细胞病变。但对于代谢慢的细胞，如原代细胞、MSC 等，则需要更长的时间来产生病变，因此病毒感染 72~96 小时后才能观察到细胞病变。

**下图为 gga-OVAL 慢病毒按 MOI=10 转导 4T1 细胞 48h 后拍摄的照片。**



- 7) gga-OVAL 慢病毒携带有抗性基因，在病毒感染 48~72 小时后向培养基中加入相应的抗生素，可有效地筛选和富集稳转细胞。抗生素筛选实验还需要设置一孔不加病毒的细胞作为对照，用来判断筛选结束的时间点。每 2-3 天更换含抗生素的完全培养液，直到对照组细胞完全飘起死亡。

### 对于悬浮细胞：

- 1) 感染细胞当天准备好 1 个 12 孔板，将细胞吹打混匀，计数；每孔接种  $3 \times 10^5$  的细胞量，摇晃均匀，即可感染。
- 2) 将病毒从冰箱取出置于冰上融化，用移液器轻柔吹打混匀。
- 3) 加入 polybrene 至终浓度为  $5 \sim 8 \mu\text{g/mL}$ ，根据病毒的滴度 T (TU/mL) 和细胞量 N 计算所



需的病毒体积，直接吸取病毒液加入细胞中，轻柔吹打混匀后放培养箱内继续培养。病毒用量的计算公式为： $V(\mu\text{L}) = 1000 \times \text{MOI} \times N/T$ 。例：如果  $\text{MOI}=20$ ，病毒滴度为  $5 \times 10^8 \text{ TU/mL}$ ，细胞量为 500000，则加入的病毒体积为 20  $\mu\text{L}$ 。

- 4) gga-OVAL 慢病毒共同转导 24 小时后，离心去除含有病毒和 Polybrene 的培养液，更换新鲜的完全培养液。注意：病毒感染时间太长可能会影响细胞状态，这种情况可以将病毒感染时间缩短至 6~8 小时。
- 5) gga-OVAL 慢病毒不携带荧光基因，在病毒感染 48~72 小时后可通过显微镜观察细胞产生病变的面积以判断表达效果。
- 6) gga-OVAL 慢病毒携带有抗性基因，亦可在病毒感染 48~72 小时后向培养基中加入相应的抗生素，用于筛选 稳转细胞。

**注意：**为了获得较好的药筛结果，建议进行药筛预实验，用不同浓度的抗生素来测试野生型细胞，制作致死曲线，选出一个可以完全杀死未有效转导的细胞，但又不会影响有效转导细胞的浓度。下表列出了 4 种常用抗生素的药筛浓度以及时间。

| 抗生素名称  | Puromycin             | Blasticidin           | Hygromycin B             | G418                      |
|--------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|
| 常用工作浓度 | 1~10 $\mu\text{g/mL}$ | 5~30 $\mu\text{g/mL}$ | 100~500 $\mu\text{g/mL}$ | 400~1000 $\mu\text{g/mL}$ |
| 筛选时间   | 2~3 天                 | 7~10 天                | 3~5 天                    | 4~7 天                     |

## 慢病毒使用的安全须知

源井生物生产的慢病毒属于“第三代”慢病毒载体，其基因组的 3' LTR 经过突变形成了所谓的“自失活” (Self-inactivation, SIN)，即该病毒基因组整合到细胞基因组后，不会产生新的子代病毒，因此具有较好的安全性。但该病毒仍具有感染人原代细胞的能力，有潜在的生物学危险。源井生物建议您操作病毒时按照 BSL-2 安全防护水平，穿戴实验服、口罩和手套等防护用具，使用生物安全柜进行实验。接触过病毒的枪头、离心管、培养板、废液等物品可用常规灭菌程序 (121°C, 20 分钟) 进行病毒灭活。



## ■ 常见问题

### 1) 慢病毒对目的细胞的感染效率较低，如何提高病毒的感染效率？

一般可以通过提高 MOI 值、延长病毒感染时间、添加 Polybrene 来提高病毒的感染效率。另外，细胞状态也对感染效率有较大影响，良好的细胞状态是获得高感染效率的保证。对于悬浮细胞，还可以通过离心感染。

### 2) 加入病毒后，目的细胞的状态变差，怎么办？

可能细胞对慢病毒或 Polybrene 比较敏感，请降低感染的 MOI 值、撤除 Polybrene，及时观察细胞状态，调整换液的时间。

